Группа ВКонтакте https://vk.com/fizmathim_resh

Перейти на Готовые решения ИДЗ Рябушко (по вариантам)

Решение задач по высшей математике на заказ

Перейти на Бесплатные решенные примеры по высшей математике

ИДЗ 13.2 – Вариант 0

1. Расставить пределы интегрирования в тройном интеграле $\iint_V f(x,y,z) dx dy dz$, если область V ограничена указанными поверхностями. Начертить область интегрирования

1.0. V:
$$x \ge 0$$
, $y \ge 0$, $z \ge 0$, $x + y = 2$, $z = x^2 + y^2$

Для вычисления тройного интеграла справедлива следующая формула


$$\iiint\limits_{V} f(x,y,z) dxdydz = \int\limits_{a}^{b} dx \int\limits_{\varphi_{1}(x)}^{\varphi_{2}(x)} \int\limits_{\psi_{1}(x,y)}^{\psi_{2}(x,y)} f(x,y,z)dz$$

Тогда согласно данной формуле получаем:


$$\iiint_{V} f(x, y, z) dxdydz = \int_{0}^{2} dx \int_{0}^{2-x} dy \int_{0}^{x^{2}+y^{2}} f(x, y, z) dz$$

Данное тело ограничено координатными плоскостями, плоскостью x + y = 2, параллельной оси Oz, и параболоидом вращения $z = x^2 + y^2$.

В проекции на ХОУ



Область интегрирования



Группа ВКонтакте https://vk.com/fizmathim_resh

Перейти на Готовые решения ИДЗ Рябушко (по вариантам)


Решение задач по высшей математике на заказ

Перейти на Бесплатные решенные примеры по высшей математике

2. Вычислить данные тройные интегралы.

2.0.
$$\iiint_{V} xy^{2}z^{2}dxdydz, V: 0 \le x \le 3, -1 \le y \le 0, 0 \le z \le 2$$

Для данной области, на основании формулы



Решение тройного интеграла

$$\iiint_{V} xy^{2}z^{2} dxdy dz = \int_{0}^{3} dx \int_{-1}^{0} dy \int_{0}^{2} xy^{2}z^{2} dz = \int_{0}^{3} dx \int_{-1}^{0} dy \cdot \frac{xy^{2}z^{3}}{3} \Big|_{0}^{2} = \int_{0}^{3} dx \int_{-1}^{0} dy \cdot \left(\frac{xy^{2} \cdot 2^{3}}{3} - \frac{xy^{2} \cdot 0^{3}}{3}\right) = \int_{0}^{3} dx \int_{-1}^{0} \frac{8xy^{2}}{3} dy = \frac{8}{3} \int_{0}^{3} xdx \int_{-1}^{0} y^{2} dy = \frac{8}{3} \int_{0}^{3} xdx \cdot \frac{y^{3}}{3} \Big|_{-1}^{0} = \frac{8}{3} \int_{0}^{3} xdx \cdot \left(\frac{0^{3}}{3} - \frac{(-1)^{3}}{3}\right) = \frac{8}{3} \int_{0}^{3} xdx \cdot \frac{1}{3} = \frac{8}{9} \int_{0}^{3} xdx = \frac{8}{9} \cdot \frac{x^{2}}{2} \Big|_{0}^{3} = \frac{4x^{2}}{9} \Big|_{0}^{3} = \frac{4 \cdot 3^{2}}{9} - \frac{4 \cdot 0^{2}}{9} = \frac{4 \cdot 9}{9} = 4$$

Группа ВКонтакте https://vk.com/fizmathim_resh

Перейти на Готовые решения ИДЗ Рябушко (по вариантам)

Решение задач по высшей математике на заказ

Перейти на Бесплатные решенные примеры по высшей математике


3. Вычислить тройной интеграл с помощью цилиндрических или сферических координат.

3.0.
$$\iiint\limits_V \sqrt{x^2 + y^2} \, dx dy \, dz \,, \, \upsilon \colon x^2 + y^2 = 4x, \, x + z = 4, \, z \geq 0$$

$$x^2 + y^2 - 4x + 4 - 4 = 0$$

$$(x-2)^2 + y^2 = 4$$

Цилиндр с окружностью в основании с центром в точке (2; 0), радиусом R = 2



Перейдем к цилиндрическим координатам ρ , ϕ , z по формулам, в которых для данной области $x = \rho \cos \phi, \ y = \rho \sin \phi, \ z = z$

$$x^2 + y^2 = 4x \Rightarrow \rho^2 \cos^2 \varphi + \rho^2 \sin^2 \varphi = 4\rho \cos \varphi \Rightarrow \rho^2 (\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi) = 4\rho \cos \varphi \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \rho^2 = 4\rho\cos\phi \Rightarrow \rho = 4\cos\phi$$

$$z = 4 - x \Rightarrow z = 4 - \rho \cos \varphi$$

где
$$0 \le \rho \le 4\cos\varphi; -\pi/2 \le \varphi \le \pi/2; \ 0 \le z \le 4 - \rho\cos\varphi;$$

$$J = \rho$$
, $dxdydz = \rho d\rho d\phi dz$

Получаем:

Группа ВКонтакте https://vk.com/fizmathim_resh

Перейти на Готовые решения ИДЗ Рябушко (по вариантам)

Решение задач по высшей математике на заказ

Перейти на Бесплатные решенные примеры по высшей математике

Группа ВКонтакте https://vk.com/fizmathim_resh

Перейти на Готовые решения ИДЗ Рябушко (по вариантам)


Решение задач по высшей математике на заказ

Перейти на Бесплатные решенные примеры по высшей математике

4. С помощью тройного интеграла вычислить объем тела, ограниченного указанными поверхностями. Сделать чертеж.

4.0.
$$x \ge 0$$
, $y \ge 0$, $z \ge 0$, $x + y = 2$, $z = 2(x^2 + y^2)$

Данное тело ограничено координатными плоскостями, плоскостью x + y = 2, параллельной оси Oz, и параболоидом вращения $z = 2(x^2 + y^2)$.



где область D ограничена треугольником, лежащим в плоскости Оху, для которого $0 \le x \le 2, \ 0 \le y \le 2-x$, следовательно, искомый объем тела равен

$$\begin{split} & \iiint\limits_{V} dx dy \, dz = \int\limits_{0}^{2} dx \int\limits_{0}^{2-x} dy \int\limits_{0}^{2(x^{2}+y^{2})} dz = \int\limits_{0}^{2} dx \int\limits_{0}^{2-x} dy \cdot z \bigg|_{0}^{2-x} dy \cdot z \bigg|_{0}^{2-x} dy \cdot (2x^{2}+2y^{2}-0) = \int\limits_{0}^{2} dx \int\limits_{0}^{2-x} (2x^{2}+2y^{2}) dy = \\ & = \int\limits_{0}^{2} dx \cdot \left(2x^{2}y + \frac{2y^{3}}{3}\right) \bigg|_{0}^{2-x} = \int\limits_{0}^{2} dx \cdot \left(2x^{2}(2-x) + \frac{2(2-x)^{3}}{3}\right) = \int\limits_{0}^{2} \left(4x^{2}-2x^{3} + \frac{2(2-x)^{3}}{3}\right) dx = \\ & = \left(\frac{4x^{3}}{3} - \frac{2x^{4}}{4} - \frac{2(2-x)^{4}}{3\cdot 4}\right) \bigg|_{0}^{2} = \left(\frac{4x^{3}}{3} - \frac{x^{4}}{2} - \frac{(2-x)^{4}}{6}\right) \bigg|_{0}^{2} = \left(\frac{4\cdot 2^{3}}{3} - \frac{2^{4}}{2} - \frac{(2-2)^{4}}{6}\right) - \\ & - \left(\frac{4\cdot 0^{3}}{3} - \frac{0^{4}}{2} - \frac{(2-0)^{4}}{6}\right) = \frac{32}{3} - 8 + \frac{16}{6} = \frac{32}{3} - 8 + \frac{8}{3} = \frac{40}{3} - 8 = \frac{40 - 24}{3} = \frac{16}{3} \end{split}$$